锦宏教育微信公众号：jh985211　　锦宏教育客服微信：18117901643

2026—2027 学年度上期高 2028届期中考试


地理试卷

考试时间：75 分钟　　满分：100 分

第 I 卷 选择题（共 48 分）

第 I 卷共 24 个小题，每小题有四个选项，只有一个选项最符合题意。每小题 2 分，共 48 分。请用 2B 铅笔在答题卡上将所选答案的代号涂黑。

读“我国某河流上游部分河段年平均气温分布示意图”，完成 1~2 题。




1．图中河流的流向大致为（　）

A．自东南向西北　　B．自西北向东南　　C．自西南向东北　　D．自东北向西南

2．图中河流流速最快的河段是（　）

A．甲乙河段　　B．乙丙河段　　C．丙丁河段　　D．丁戊河段

相对高度能够反映地面的起伏状况，高度和坡度的组合能够反映地表的形态特征。下图为东南亚某地等高线地形图。据此完成 3~4 题。




3．图示地区（　）

A．高原坦荡，草原广阔　　B．地形以低山、丘陵为主

C．山高谷深，森林密布　　D．地形以平原、丘陵为主


4．下列沿 P—P'线绘制的地形剖面图，正确的是（　）

锦宏教育微信公众号：jh985211　　锦宏教育客服微信：18117901643



A．A　　B．B　　C．C　　D．D

我国台湾省南部兰屿的清水湾（约22°N，121.5°E），以适合观看海上日出而闻名。在一年中某时段，日出位置经历由①到②到③的移动过程。据此完成5~7题。



清水湾某时段日出方向变化示意图



清水湾日出景观

5．该时段处于（　）

A．春分到夏至之间　　B．夏至到秋分之间

C．秋分到冬至之间　　D．冬至到春分之间

6．关于该时段的说法正确的是（　）


A．北京昼长夜短且昼渐长夜渐短　　B．北京正午旗杆影子朝正南且影子逐渐变短

C．北京昼短夜长且昼渐短夜渐长　　D．北京正午旗杆影子朝正北且影子逐渐变长

7．拍摄日出时，当地时间约为（　）

A．5：34　　B．5：46　　C．6：34　　D．6：46

下图示意某地地质剖面。据此完成8~9题。




8．图中①②③④形成的先后顺序是（　）

A．③④①②　　B．④①②③　　C．④①③②　　D．④③②①

9．乙处的构造地貌是（　）

A．背斜谷　　B．向斜谷　　C．断陷盆地　　D．断块山地

石花是一种常见的洞穴沉积物，经常生长在石钟乳或石笋的表面，因形似花朵而得名。云南多乐原溶洞是由同一地下河发育的4层溶洞，已开发的第1、3层溶洞发现大量高悬的石花。如图示意该洞穴石花的形成过程及石花景观。据此完成10~12题。



10．图中①②③所示的地貌名称依次为（　）

A．石笋、石柱、石钟乳　　B．石笋、石钟乳、石柱

C．石钟乳、石笋、石柱　　D．石钟乳、石柱、石笋

11．多层溶洞形成期间该地地壳（　）

A．相对稳定　　B．间歇性抬升

C．间歇性下降　　D．先抬升后下降

12．该溶洞中石花悬空的主要外力作用是（　）

A．流水侵蚀　　B．流水沉积　　C．风力侵蚀　　D．风化作用

在沂蒙山区，人们常会发现这样的山峰：呈圆形的顶部平展开阔，峰巅周围峭壁如削，峭壁下坡度由陡到缓，周围不少人家采山上的石头垒房子，竟然发现有三叶虫化石！据此完成13~14题。



13．与形成这种山峰的主要岩石成因相同的是（　）

A．花岗岩　　B．玄武岩　　C．石灰岩　　D．大理岩

14．该地貌形成主要经历的地质过程依次是（　）


A．外力沉积—固结成岩—地壳抬升—风化侵蚀

B．侵蚀搬运—岩浆侵入—地壳抬升—固结成岩

C．固结成岩—板块运动—地壳断裂—流水侵蚀

D．岩浆侵入—地壳抬升—风化剥蚀—侵蚀搬运

我国北方科研团队探究日光温室保温性能：双膜温室在单膜外增设棚膜，两层膜间留存静止空气夹层，与单膜温室、露天环境对比测温。下图为某日露天、单膜、双膜温室气温日变化示意图。据此完成15~16题。



15．根据气温日变化特征，推测当日天气状况为（　）

A．重度雾霾　　B．和风细雨　　C．天朗气清　　D．多云微风

16．双膜温室保温优于单膜的主要原因是（　）

A．双层薄膜增多了短波入射总量　　B．夹层空气减少了地面热量散失

C．双层薄膜增强对逆辐射的反射　　D．夹层空气增强了对太阳辐射的吸收

云通常是水汽在上升过程中冷却凝结而成。人们乘坐飞机经过夏威夷群岛时，常常会发现海面上空晴朗无云，而岛屿上空却出现与陆地形态相似的云层（下图）。据此完成17~18题。

17．与海面相比，岛屿的上空更容易形成云层是因为岛屿（　）

A．气流易上升　　B．冷却降温快

C．植被蒸腾强　　D．水汽蒸发多



18．该景观最可能出现在（　）


A．多云大风的白天

B．晴朗无风的白天

C．晴朗大风的夜晚

D．多云无风的夜晚

在锋面暖气团中产生的水汽凝结物（云滴或雨滴）落入较冷的气团内，经蒸发使近地面的低层空气达到饱和而形成水平能见度在1km以内的天气现象，称为锋面雾。贵州受昆明准静止锋影响，常有锋面雾出现，且伴有毛毛细雨，这使得该地区锋面雾影响时间更久、浓度更高、消散更慢。某年某月21日前后，贵州部分地区出现了一次典型的锋面雾。下图示意该月20日08：00至22日14：00贵阳市、安顺市、六盘水市水平能见度变化。据此完成19~21题。



19．此次锋面雾最可能出现在（　）

A．春季　　B．夏季　　C．秋季　　D．冬季

20．贵阳市、安顺市、六盘水市三地同时出现锋面雾的时段是（　）


A．20 日 8：00 前后　　B．20 日 23：00 前后

C．21 日 8：00 前后　　D．21 日 23：00 前后

21．毛毛细雨使锋面雾影响时间更久、浓度更高、消散更慢，主要是因为其（　）

A．增强大气辐射　　B．增强地面辐射　　C．增加大气湿度　　D．降低大气温度

下图示意北半球某城市不同深度的土壤平均温度分布，该城市各季节 0cm 地温与气温的差值均在 4℃以内。据此完成 22~24 题。



22．该城市的气候类型最可能是（　）

A．温带海洋性气候　B．亚寒带针叶林气候　C．温带季风气候　　D．地中海气候

23．若该城市位于亚欧大陆东部，则其气候成因主要是（　）

A．常年受大陆气团控制　　B．气压带和风带的季节性移动

C．常年受西风带控制　　D．海陆热力性质差异显著

24．该地冬季土壤温度表层低于深层的根本原因是（　）

A．太阳高度低，获得的太阳辐射较多　　B．与大气直接接触，热量快速散失

C．地表积雪覆盖，反射太阳辐射　　D．冬季多强风，表层热量大量散失


锦宏教育微信公众号：jh985211　　锦宏教育客服微信：18117901643

第Ⅱ卷 综合题（共 52 分）

第Ⅱ卷共3个题，共 52 分。请将试题答案写在答题卡对应位置，在试卷上答题不得分。

25．阅读图文资料，完成下列要求。（16 分）

温泉是从地下自然涌出泉口，且温度显著高于当地年平均气温的天然泉水。适宜的地质构造、充足的地下水和热量供给是温泉形成的必备条件。北美大陆西部地区受构造运动影响温泉众多，且随着山系的逐步隆升，气候演化显著。下图示意“北美大陆局部区域地形与温泉分布情况”。



(1)从板块位置和边界类型说明北美大陆温泉的集中分布区。（4 分）

(2)从内力作用角度分析北美大陆温泉集中分布区的温泉成因。（6 分）


(3)分析构造运动对图示西部地区降水的影响。（6 分）


锦宏教育微信公众号：jh985211　　锦宏教育客服微信：18117901643

26．阅读图文材料，完成下列要求。（20 分）

材料一：洪积扇是水流搬运碎屑物质而形成的扇形堆积体。贺兰山东麓洪积扇众多，这些洪积扇的规模与断层活动有关。大多数洪积扇的堆积物以砾石为主，耕地主要分布在洪积扇边缘。

材料二：左图为“贺兰山东麓洪积扇分布示意图”，右图为“贺兰山东坡地质构造及地貌剖面示意图”。





(1)描述贺兰山洪积扇的分布特征。（4 分）

(2)分析断层有利于贺兰山洪积扇规模扩大的原因。（6 分）


(3)与该地其他洪积扇相比，说明甲地洪积扇堆积物中砾石较少的原因。（4 分）

(4)分析贺兰山耕地主要分布在洪积扇边缘的自然原因。（6 分）

锦宏教育微信公众号：jh985211　　锦宏教育客服微信：18117901643

27. 阅读图文材料，完成下列问题。（16 分）

登巴萨市是印度尼西亚巴厘岛的最大城市，也是巴厘省首府。该岛降水丰富且季节变化大。巴厘岛是世界著名旅游岛，每年 7 月到 8 月是登巴萨旅游的最佳时间。下图分别示意巴厘岛位置和登巴萨市的气候资料。



(1)分析登巴萨 4 月气温全年最高的原因。（4 分）

(2)分析登巴萨 11 月至次年 3 月降水丰富的原因。（6 分）

(3)从气候角度分析每年 7 月到 8 月是登巴萨旅游最佳时间的原因。（6 分）

锦宏教育微信公众号：jh985211　　锦宏教育客服微信：18117901643

2026—2027学年度上期高2028届期中考试

地理参考答案

1—5：CBB(B/C)B　　6—10：DBBAC

11—15：BBCAC　　16—20：BABDC

21—24：CCDB

25.(1)分布在太平洋板块（1分）与美洲板块（1分）的消亡边界（2分）。

(2)板块挤压，构造运动强烈（2分），断裂发育（1分），为地下水出露提供通道；岩浆活动强烈（2分），地热丰富，为温泉形成提供热量供给（1分）。

(3)地壳隆起，形成南北向高大的山系；阻挡海洋来的湿润气流；山系西侧降水增多，东侧降水减少（图示西部地区趋于干旱、山间盆地降水减少）。（每点2分，共6分）

26.(1)沿贺兰山东麓呈带状分布；多分布在河流、沟谷的出山口附近。（每点2分，共4分）

(2)断层发育，岩石破碎（1分），碎屑物质增多（1分）；断层抬升（1分）使山体相对高度增大，河流落差增大，流水侵蚀搬运能力增强（1分）；断层活动使贺兰山东麓断裂下陷（1分），地势低平（1分），为洪积扇形成提供了沉积空间。

(3)河流落差小，流速慢，侵蚀能力弱（2分）；河流较长，大量砾石堆积在山区河道中（2分）。

(4)洪积扇边缘地势低平（2分），便于耕作；扇缘沉积物粒径较小，土壤较肥沃（2分）；扇缘地下水较丰富，农业生产用水便利（2分）。

27.(1) 降水较少（1分），大气对太阳辐射的削弱作用弱（1分）；太阳高度较大（2分）。

(2)11月到次年3月，赤道低压带位于南半球，气流上升，降水丰富；东北信风越过赤道后，在地转偏向力影响下形成西北季风，从海洋带来充足水汽，降水丰富。（每点3分，共6分）

(3)此时段太阳直射北半球，巴厘岛太阳高度较小（2分）；且受来自澳大利亚的较冷空气北上影响（1分），气温较低（1分）；赤道低压位于北半球（受东南信风影响）（1分），降水较少（1分），适合旅游。